

SOBREDOSIS DE OPIOIDES Y EMBARAZO

En caso de sobredosis, administrar naloxona (Narcan) puede salvar vidas: tanto las de las personas embarazadas como las de sus bebés.


1. NARCAN NALOXONA

2. RESPIRACIONES DE RESCATE

3. BUSCAR AYUDA

Una sobredosis hace más lenta o detiene la respiración e impide que el oxígeno llegue al cuerpo y en especial al cerebro.


Verifica la respiración.



✦ Respiración de rescate

Administra el Narcan.

- Inserta con cuidado la punta del spray de naloxona en cualquier fosa nasal.
- Presiona firmemente el émbolo para administrar la dosis.
- Retira el spray.



Coloca a la persona en posición lateral de seguridad sobre su lado izquierdo para mejorar el flujo de sangre hacia la placenta.



Si crees que la persona se lastimó la espalda o el cuello, no la muevas.

Consigue Naloxone nextdistro.org/naloxone

Llama al 911

Indica al operador que estás con una persona embarazada que no respira y que necesitas paramédicos.



No hace falta que digas que puede ser un caso de sobredosis o intoxicación por drogas. Si dices eso, existe la posibilidad de que envíen oficiales de policía.


Quédate con la persona o encuentra a alguien que pueda quedarse hasta que lleguen los paramédicos.



Las leyes "del buen samaritano" protegen a las personas que ayudan a quienes pueden estar atravesando una sobredosis.

Cuando la ayuda llega...

Explica a los paramédicos que la persona consume opioides y que quizá tomó muchos y tuvo una sobredosis.



Ante un caso de sobredosis de una persona embarazada, responde exactamente como lo harías con cualquier otra persona.

